




STDの原因が実は包茎だった。 と、いうことがあります。

STD（性感染症）の原因の一つに包茎があげられます。
包茎を治療することは、性病からペニスを守る一つの方法です。

包茎の場合、 とくに引き起こしやすい性病。

包茎の場合、亀頭が常に包皮に覆われているため、通気性がなく亀頭の根元が常に湿った状態にあります。ここは恥垢がたまりやすく、さまざまな病原菌を繁殖させる温床になってしまうのです。不衛生であることから、STD（性病）へのヒット率も高まるというわけです。また、国際学会などでは、包茎とHIV(エイズ)の関連性を説く専門医もいるくらいです。

包茎の方が感染しやすい性病で、症例が多いものに尿道炎とコンジロームがあります。尿道炎はセックスなどを通して淋菌やクラミジア菌に感染する性病です。（尿道炎の80%は淋病かクラミジア）セックス時に、包茎の余った皮が引っ張られ、尿道口が広がりやすくなります。そこから雑菌などが入って感染するため、正常な人に比べ数倍かかりやすいと言われます。



包茎が包皮炎を起こし、 包皮が性病を起こす。

性病の範ちゅうには入らないのですが、包皮炎や亀頭周囲炎は、包茎の人に多い病気です。これはセックス時などに、余った包皮がこすれて炎症を起こしたり、傷ついた包皮が雑菌に感染し、炎症を起こし、痒みや腫れなどの症状を引き起こすのです。さらに、炎症を起こした箇所から性病に感染する可能性が高くなるだけでなく、HIVなどの血液を媒介とする性感染症にかかる危険性もあります。



症状で見る性感染症

セックスや風俗で遊んだ後などで、ペニスやその周辺が「痒い」「痛い」「腫れている」「膿が出る」などの症状があれば、まず、STD（性感染症）の疑いがあります。そんな時には一人で悩まず、すぐに専門医に相談しましょう。上野クリニックでは包茎治療だけではなく、性感染症の検査・治療を行っています。

Q1 ペニスにイボのようなブツブツができた

ペニスにイボのようなものができる症状は「コンジローム」が考えられます。亀頭部分、包皮の内側部分にカリフラワーや鶏のとさかのような大きなブツブツができます。

Q2 ペニスにしこりがある

ペニスにコリコリとしたしこりを感じる場合は「コンジローム」などの疑いがあります。赤味のかたいしこりの時は「梅毒」の第一期症状の可能性もあります。

Q3 排尿時にしみるような痛みがある

排尿時の痛みや、尿道のかゆみの症状は「淋病」「クラミジア」「トリコモナス」などが考えられます。ひどい痛みを感じるなら「淋病」「クラミジア」を疑ってみましょう。

Q4 ペニスの先端からウミが出る

尿道口からウミが出る症状で考えられるのは「淋病」と「クラミジア」です。クリーム色のウミがジクジクと出る場合は「淋病」、やや水っぽい白いウミが出る場合は「クラミジア」が考えられます。

Q5 ペニスがかゆい

ペニスのかゆみは、ウイルスによる「クラミジア」や「性器ヘルペス」などと真菌による「いんきん・たむし」、さらに寄生虫による「毛じらみ」などがあります。

Q6 ペニス腫れた

ペニスがかゆい場合、膿が出たり、排尿時に痛いなどの他の症状が出ている場合が多いもの。その場合「淋病」や「クラミジア」の可能性が高いといえます。

Q7 股の付け根のリンパ腺が腫れた

太ももの付け根部分のリンパ腺が腫れてかたいしこりになった症状は「梅毒」の第一期症状や「性器ヘルペス」などの可能性が考えられます。

Q8 おしっこの色が変

排尿時にペニスの先端が痛み、尿が出にくい。さらに出たら血が混じっている。こんな症状の時は「淋病」が考えられます。また、尿が赤茶っぽく、体がだるく黄疸が出はじめたら「B型肝炎」の可能性もあります。

Q9 ペニスが痛い

排尿時に限らずペニスがかゆい場合、ペニスの亀頭部が赤く腫れヒリヒリした痒みを伴う症状なら「性器ヘルペス」の疑いがあります。

Q10 ペニスに水疱ができた

ペニスに水疱ができる症状は「性器ヘルペス」が考えられます。かゆみやヒリヒリした痛み、熱を感じた後、数日後で米粒大の水疱ができます。

病名で見る性感染症

病名	症状	原因	感染源	包茎関与	治療法	
尿道炎 (80%が淋菌 クラミジア)	排尿時に痛みが走り膿が出る。	淋菌性	淋菌(細菌)	性交渉など、直接 接触による感染。	中	早期診断による抗生物質 の服用。 ※潜伏期間は男女とも 2~7日間。
		非淋菌性	クラミジア 大腸菌	性交渉など、直接 接触による感染。 ※繰り返し感染する 可能性がある。	中	
尖圭 コンジローム	包皮の内側や亀頭の根元、 陰茎などに、小さなイボ状 のツブツブができる。	ウイルス性疾患	性交渉など、直接 接触による感染。	大	特殊器具により焼却処理。 ※早期診断、早期治療が 必要。 ※潜伏期間は1~6ヶ月 くらい。	
梅毒	第1期は陰茎に潰瘍がで きたり、リンパ腺が腫れる。 第2期は全身に発疹。 第3期はゴム腫という腫 瘍が出る。 第4期は脳や神経が冒さ れる。	梅毒スピロヘーター	性交渉など、直接 接触による感染。	中	早期診断による抗生物質の 投与。 ※潜伏期間は約3週間 ※第1期は3月まで ※第2期は3月~2年 ※第3期は2年以降 ※第4期は10年以上	
トリコモナス	排尿時に痛みが走り膿が 出る。痒みも強く感じる。	トリコモナス鞭毛菌	性交渉など、直接 接触による感染。 ※男女間で繰り返し 感染する可能性が ある。	中	男女とも治療が必要で、 抗トリコモナス剤を投与 すれば1~2週間で完治。	
性器・口唇 ヘルペス	温疹や細かい水疱が陰 茎にでき、ただれる。 痒みも強く感じる。	単純ヘルペス 2型ウイルス (性器ヘルペス)	病巣部からの直接 感染。 ※オーラルセックスに よる感染もあり。	大	抗ヘルペスウイルス剤の 投与や軟膏の塗布。 ※潜伏期間は2~7日間 くらい。	
エイズ	潜伏期間が長く、発見し にくい。 発症すると微熱が続き、 リンパ腺が腫れる。	HIVウイルス	血液や精液を介して 感染。 ※包皮炎などの傷が あれば感染率はさ らにアップ。	大	発症したら病院において 入院治療を行う。 ※潜伏期間は2~4週間。 その後、数ヶ月から15年 で発病。	
B型肝炎	発熱や倦怠感があり、 肝臓周辺が痛む。 黄だんが出る。	B型肝炎ウイルス	血液、精液、唾液等 を介して感染。 ※傷があれば感染率は さらにアップ。	大	発症したら病院において 入院治療を行う。 ※潜伏期間は1~6ヶ月 くらい。	
毛じらみ	陰毛部に強烈な痒みが 走る。 掻いても掻いても痒み は止まらない。	ピゼンダニ・シラミ	性交渉など、直接 接触による感染。 ※時にはプール、サウナ 等で感染する。	なし	軟膏やパウダーを塗布。	

STD治療の4ポイント

- 1 かゆい・痛い・はれる・ウミが出る…すぐ電話!
- 2 亀頭根元のツブツブなど、異常な時はすぐ検査!
- 3 ほとんどの性病は早めの治療で完治する。
- 4 包茎は性病を引き起こす原因になりやすい!

☎ 0120-508-550

